

109學年度碩博班招生考試 防疫窗口會議

109年2月27日

防疫物資聯繫窗口及數量分配

單位	聯絡窗口	分機	耳溫槍	額溫槍	護目鏡	手套	酒精 (使用人次)
音樂學院	洪雅惠	3015	1	1	1	20双	277
傳音系	蘇芳玉	3052	1	1	1	20双	13
美術學院	邱雅蕙	3120	1	1	1	20双	241
戲劇學院	楊曜彰	3215	1	1	1	20双	132
劇設所	劉依靜	3715	1	1	1	20双	28
舞蹈學院	葉國隆	3312	1	1	1	20双	50
文資學院			1				
藝教所	陳泓霖	3452	/	1	1	20双	257
藝管所	王怡婷	3422	/	1	1	20双	
博館所	黃秀梅	3412	/	1	1	20双	
建文所	葉芳芸	3432	/	1	1	20双	
文創學程	黃靖雅	3462	/	1	1	20双	
人文學院	游巧雯	3618	1	1	1	20双	38
電影所	林芯菱	3908	1	1	1	20双	60

口罩

- 若需重複使用，可在出現髒污、破損、潮溼、或呼吸有異味等情形時，才需更換。
- 若稍後欲繼續使用該口罩時，建議可先將口罩污染一面往內摺後，放置於乾淨、透氣的容器內(如紙袋等)保存。用以保存口罩之容器應於使用後丟棄或定期清潔。
- 脫除口罩時，應避免直接碰觸口罩外側。口罩脫除後也應洗手。



正確戴口罩4步驟



中央流行疫情指揮中心 關心您

2020/02/01

護目鏡

- 目的：保護眼睛以免受到噴濺
- 注意事項：
 - 應與眼部周圍緊密貼合
 - 個人使用的眼鏡不適宜當成護目鏡的替代品
 - 需替換使用時，可以酒精消毒



防護用具穿脫順序

- 穿戴順序：

- 1、洗手
- 2、口罩(正確穿戴)
- 3、護目鏡
- 4、手套

- 脫除順序：

- 1、手套(內面朝外反脫)
- 2、護目鏡
- 3、口罩(勿接觸口罩前部)
- 4、洗手

體溫量測辦法

※量測體溫時與他人保持手臂長度的距離。

• 額溫量測方式：

- 請放於額頭前方2公分處，撥開瀏海、擦乾汗滴，

34.4-37.4⁰c正常範圍


37.5⁰c ↑ 請以耳溫槍再次確認

• 耳溫量測方式：

- 請將耳套置入耳溫槍量頭並緊壓耳套
- 確定耳套已緊固在耳溫槍後，進行耳溫測量
- 深入耳內，將外耳翼向上向後拉
- 量測結束，按下退套鈕，勿用手碰觸使用過的耳溫套

38⁰c ↑ 請通知衛生保健組(分機1332. 1331)進行評估

國立臺北藝術大學招生考試 因應「嚴重特殊傳染性肺炎」試場處理流程圖



漂白水稀釋及注意事項

- 含氯漂白水之使用方法（使用時請穿戴防水手套並注意安全）：
- 取市售家庭用含氯漂白水（次氯酸鈉濃度一般在5到6%）5湯匙（一般喝湯用的湯匙，約15至20 c.c.）或小瓶養樂多1瓶（約100c.c.）的量。
- 加入10公升的自來水中（大寶特瓶每瓶容量1,250 c.c.，8瓶即等於10公升），攪拌均勻即可。
- 環境消毒重點
- 不需要大規模噴藥消毒。
- 只需對於會接觸到之物體表面（門把、課桌椅、樓梯扶把）做重點性消毒。
- 清洗完畢的物體可移至戶外，接受陽光照射。
- 消毒之廢棄物請確實包紮好後丟棄，或以稀釋漂白水噴灑後確實包裝再行丟棄。
- [消毒水調配教學影片](#)

自己調配消毒水 啦啦，好簡單



消滅對象：細菌、真菌、病毒



用途：一般環境、物品消毒



材料：
市售含氯漂白水、清水

濃度：500ppm
稀釋倍數：100倍



稀釋方法：

小量：10cc漂白水
+1公升清水中



大量：100cc漂白水
+10公升清水中



當天配製好要標示日期名稱
未使用完在24小時後應丟棄喔！